


SÉCURITE ROUTIÈRE

&

La signalétique des médicaments



La signalétique

Le conditionnement extérieur des boîtes comporte des signes ou des pictogrammes

Avant 2005



Dans tous les cas il est utile d'évoquer ce sujet avec son médecin traitant ou avec le pharmacien qui délivre les médicaments.

➔ Depuis 2005, trois nouveaux pictogrammes



Médicaments contre le rhume, la toux, l'hypertension artérielle ...

➔ *La prise de médicaments ne remet pas en cause la conduite*



Antidépresseurs, anti-douleurs, médicaments du diabète, de l'allergie...

➔ *La prise de médicaments peut parfois remettre en cause la conduite*



Somnifères, tranquillisants, collyres...

➔ *La conduite est formellement déconseillée*

Durée d'élimination des médicaments

Certains médicaments seront rapidement éliminés du système sanguin, d'autres seront éliminés plus tardivement. L'élimination est aussi retardée en cas de prise régulière.

Quelques exemples :

- Moins de **10 h** (Halcion, Veratran, Seresta...)
- Entre **10 et 50 h** (Lexomil, Mogadon, Temesta, Valium...)
- De **30 à 150 h** (Tranxene, Lysanxia, Nordaz.....)

Cf document Guy Jadot Professeur de pharmacologie médicale et clinique

La prise d'un médicament **n'est jamais un acte anodin** surtout lorsqu'elle est associée à la conduite d'un véhicule



Arrêter de conduire ou ne prenez pas votre véhicule si vous :



- êtes **fatigué**
- avez envie de **dormir**
- sentez vos **jambes lourdes**
- avez **mal à la tête**
- avez envie de **vomir**
- avez des **troubles de la vision**
- avez une baisse sensible de la **concentration**
- avez des difficultés à **analyser les distances**
- êtes **nerveux, agacé**
- avez noté **certains troubles avec la prise du médicament** prescrit

BONNE ROUTE



